

ASA BOLUS

ACETYLSALICYLIC ACID BOLUS
ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE BOL



VETERINARY USE ONLY
USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

NET: 50 BOLUS / BOLS
DIN: 02243798

ASPIRIN BOLUSES, Mfr. Std.

Active ingredient per bolus:
Acetylsalicylic Acid 15.5 g

INDICATIONS: As in aid in the symptomatic relief of pain in cattle and horses.

DOSAGE and ADMINISTRATION: Cattle and Horses: 1 to 3 boluses orally, twice or three times per day as needed. Administer as recommended by your veterinarian.

CAUTION: Discontinue the treatment if unusual symptoms occur. The most common side effect to watch for is irritation or possible ulceration of the gastro-intestinal mucosa. Contact a veterinarian if symptoms of gastro-intestinal bleeding or distress occur (black, tarry stools; anorexia; vomiting).

STORAGE: Store between 15°C and 30°C. Protect from moisture.

WARNING: Keep out of reach of children. This package contains enough drugs to seriously harm a child.

Manufactured By:
Can-Vet Animal Health Supplies Ltd.
61 Malcolm Rd. Guelph, ON
NIK1A7 519-822-5333

BOLS D'ASPIRINE, Norme du fab.

Ingrédient actif par bol :
Acide acétylsalicylique 15,5 g

INDICATIONS : Comme adjuvant au soulagement symptomatique de la douleur chez les bovins et chevaux.

POSOLOGIE et ADMINISTRATION : Bovins et chevaux : 1 à 3 bols par voie orale, deux à trois fois par jour, au besoin. Administrer tel que recommandé par votre vétérinaire.

PRÉCAUTION : Cesser le traitement si des symptômes inhabituels apparaissent. L'effet secondaire le plus courant à surveiller consiste en une irritation ou ulcération de la muqueuse gastro-intestinale. Consulter un vétérinaire si des symptômes de saignement gastro-intestinal ou de détresse se présentent (selles noires, goudronneuses; anorexie; vomissements).

ENTREPOSAGE : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger contre l'humidité.

MISE EN GARDE : garder hors de la portée des enfants. cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire sérieusement à un enfant.

